



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Thilo-Tears® Gel

Wirkstoff: Carbomer

Zusammensetzung

1 g Augengel enthält:

Wirksame Bestandteile

Carbomer 3 mg.

Weitere Bestandteile

Benzalkoniumchlorid, Sorbitol, Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes), gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Tube mit 10 g Augengel.

Packung mit 3 x 10 g Augengel.

Wirkungsweise

Thilo-Tears Gel ist ein steriles Gel, das die Tränenflüssigkeit ersetzt.

Pharmazeutischer Unternehmer

Alcon Pharma GmbH

Blankreutestr. 1

D-79108 Freiburg

Hersteller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Anwendungsgebiete

"Trockenes Auge", Ersatz der Tränenflüssigkeit bei mangelnder oder mangelhafter Befeuchtung der Augenoberfläche.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Thilo-Tears Gel nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Hinweis für Kontaktlinsenträger

Während der Therapie sollten keine Kontaktlinsen getragen werden.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Thilo-Tears Gel?

Keine bekannt.



Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Thilo-Tears® Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Thilo-Tears Gel sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und wie lange sollten Sie Thilo-Tears Gel anwenden?


Soweit nicht anders verordnet, 4mal täglich oder je nach Bedarf einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Thilo-Tears Gel ist zur Daueranwendung geeignet.


Wie sollten Sie Thilo-Tears Gel anwenden?

Tube zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und vorsichtig dem Auge nähern.

Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger das Unterlid wegziehen.



Halten Sie die Tube zum Eintropfen senkrecht über das Auge. Drücken Sie die Tube leicht mit den Fingern, bis sich ein Tropfen ablöst, ohne dass die Tubenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.



Für die Anwendung während einer Kontaktglasuntersuchung werden einige Tropfen Thilo-Tears Gel in den haptischen Teil des Kontaktglases getropft und dieses nach Anästhesie der Horn- und Bindehaut aufgesetzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Thilo-Tears Gel auftreten?

Gelegentlich können kurz anhaltende Sehstörungen auftreten, bis das Gel auf der Augenoberfläche gleichmäßig verteilt ist.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Tube und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach Ablauf dieses Datums!

Nach dem ersten Öffnen der Tube soll Thilo-Tears Gel nicht länger als 4 Wochen verwendet werden.

Stand der Information

Dezember 2000

Weitere Information finden Sie im Internet unter: www.trockene-augen.de

Alcon®